

BorphoSTART

HNOJIVO ES DLE ES 2003/2003 S ETHANOLAMINEM BÓRU

NAWÓZ EC ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2002/2003 ETANOLAMINA BORU

FERTILIZANT CU FORMULARE EC CONFORM REGULAMENTULUI (CE) NR. 2003/2003 BORON ETANOLAMINĂ

EO TOP СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2003/2003 БОР ЕТАНОЛАМИН

Používejte pouze v případě skutečné potřeby.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Stosować tylko w razie konieczności.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

A se utiliza numai în cazul în care există o reală necesitate.

A nu se depăși dozele recomandate.

Да се прилага при необходимост.

Да не се превишават препоръчителните дози.



Živina Skład Elemente Състав	Hmotnostní % Zawartość Concentrație Концентрация	Obsah živin Zawartość Volum Нетен обем	Čistá hmotnost Waga netto Greutate netă Нето маса
Bor (B) vodorozpustný Bor (B) rozpuszczalny w wodzie Bor (B) solubil în apă Бор (B) водоразтворим	8,4%	120 g/l	
Oxid fosforečný (P₂O₅) vodorozpustný Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) wodorozcieńczalny Pentoxid de fosfor (P₂O₅) solubil în apă Фосфорен пентаоксид (P₂O₅) водоразтворим	7%	100 g/l	14,1^{Kg} 10^L



soufflet
AGRO



BG

BorphoSTART е балансирана формулация на бор-фосфор. Тези два елемента са от съществено значение за клетъчното делене. Поради това BorphoSTART гарантира увеличаване на растежа и плодородността на полена на културите.

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Култура	Дозировка	Период на приложение
Захарно цвекло	2 x 100-200 мг/дка или 2 x 1 – 2 л/ха	1-во приложение: при напълно развита листна маса (BBCH 39) 2-ро приложение: след 21 дни (BBCH 39 + 3 седмици)
Рапица	2 x 100 мг/дка или 1 л/ха	Есен: във фаза розетка, (BBCH 15) Пролет: начало на нарастване на стъблото до оформени единични цветни пъпки-затворени (BBCH 30-55)
Слънгоглед	200 мг/дка или 2 л/ха	От 5 до 8-ми лист (BBCH 15-18)
Грах, Боб, Фий, Леща	150 мг/дка или 1,5 л/ха	От 10-12 ст до поява на първи цветни пъпки (BBCH 15-51)
Люцерна	150 мг/дка или 1,5 л/ха	При подрастване и след всяко косене
Лозя	4 x 100 мг/дка или 4 x 1 л/ха	1-во приложение: фаза развитие на съцветията, цветчетата са разделени (BBCH 57) 2-ро приложение: фаза край на цъфтеж, (BBCH 69) 3-то приложение: фаза завърз, начало на наедряване на плодотеве (BBCH 71) 4-то приложение: фаза начало на узряване (BBCH 81)
Овощни дръвчета	4 x 100 мг/дка или 4 x 1 л/ха	Първо приложение: фаза начало на цъфтеж-затворен цвят (BBCH 51) следващите 3 приложения през 14 дни
Зеленуци	4 x 100 мг/дка или 4 x 1 л/ха	Добре развита листна маса

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Пригответе на сместа **1**, Да се разклати добре преди употреба **2**. Плъни се $\frac{3}{4}$ от пръскачката с вода **3**. Пуска се бъркалната на пръскачката и след това се добавя BorphoSTART **4**. Бъркането продължава до получаване на хомогенна смес **СЪВЕТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ** Да се прилага по време на активния период на растеж, избягвайки най-горещите часове на деня. Спазвайте обичайните предпазни мерки при употребата на химикали.

СМЕСИТЕЛИ BorphoSTART е съвместим с повечето продукти за растителна защита. При съмнение, препоръчително е да се правят тестове за съвместимост с използваните продукти.

ПРАЗНА ОПАКОВКА Повторната употреба на опаковката е абсолютно забранена. Когато използвате продукта, изплатнете контейнера и изсипете водата обратно в пръскачката. Предавайте празните опаковки в одобрен за целта събирателен пункт.

ОБЩИ СЪВЕТИ Да се съхранява на място, недостъпно за деца и далеч от хранителни продукти. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, на сухо и хладно място. Съхранявайте при постоянна температура и в условия, които не позволяват замръзване. Нашата отговорност е ограничена до предоставянето на продукта В оригиналната си запечатана опаковка и препоръчане на дозата, която ще се използва за всяка култура. Всеки риск, свързан със съхранението, използването на продукта, е отговорност единствено на потребителя. В случай на спешна ситуация, избягвайте спешна помощ или се свържете с ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Дата на производство: виж опаковката

Партиден номер: виж опаковката

Вносителят: СУФЛЕТ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Позитано № 37, ет.4, София, 1303

Email: agro_bulgaria@soufflet.com

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

RO

BorphoSTART este o formulare echilibrată de fosfor cu bor. Aceste două elemente sunt esențiale pentru multiplicarea celulelor. Prin urmare, BorphoSTART susține dezvoltarea plantelor și fertilitatea polenului.

APLICARE FOLIARĂ

Culturi principale	Doze	Perioada de aplicare
Stelea de zahăr	2 x 1-2 l/ha	1 aplicare la închiderea rândurilor BBCH 39. a 2-a aplicare T1+ 3 săptămâni, BBCH 39 + 3 săptămâni
Răpăț	2 x 1 l/ha	Toamna: Stadiu de rozetă, BBCH 15. În primăvară: la reluarea vegetației (C1 / C2), BBCH 30 – înainte de înflorire stadiu de muguri imbrăți (D1), BBCH 55
Floarea-soarelui	2 l/ha	La 5-8 perechi de frunze, BBCH 15/18
Mazăre, Fasole, Măzănițe, Linte	1,5 l/ha	De la 10-12 cm, BBCH 15 până la apariția mugurilor florale BBCH 51
Lucernă	1,5 l/ha	La reluarea vegetației după fiecare coasă
Viță de vie	4 x 1 l/ha	La stadiul de inflorescență, BBCH 57 – stadiul muguri florale, BBCH 69 – Stadiul de fructe fecundate, BBCH 71 și la Coacere, BBCH 81
Pomi fructiferi	4 x 1 l/ha	Prima aplicare înainte de înflorire, BBCH51, urmată de celelalte aplicații la intervale de 2 săptămâni
Legumicultură	4 x 1 l/ha	Pe suprafața foliară bine dezvoltată.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE Pregătirea amestecului **1**. Agitați bine înainte de utilizare. **2**. Umpleți rezervorul pulverizatorului până la $\frac{3}{4}$ din volumul apei necesare pentru aplicare. **3**. Porniți agitatorul și apoi turnați BorphoSTART **4**. Mențineți agitatorul în funcțiune până la omogenizarea amestecului de pulverizare.

TIPURI DE APLICARE Aplicați în timpul perioadei de creștere activă, evitând aplicarea când temperaturile sunt ridicate. Respectați măsurile de precauție obișnuite pentru utilizarea chimicalelor.

COMPATIBILITĂȚI BorphoSTART este compatibil cu cele mai multe produse de protecție a plantelor. Efectuați teste de compatibilitate fizico-chimice și biologice înainte de orice amestec nou.

AMBALAJUL GOL Reutilizarea este interzisă. Când utilizați produsul, clătiți-l și asigurați-vă că apa de clătire este turnată în rezervorul de pulverizare. Ambalajele goale trebuie să fie aruncate printr-un sistem specific de colectare.

SFATURI GENERALE Nu lăsați la îndemâna copiilor și păstrați departe de alimente. Păstrați produsul în recipientul original, într-un loc răcoros și uscat. Protejați împotriva înghețului. Păstrați la o temperatură constantă. Responsabilitatea noastră se limitează la furnizarea produsului în ambalajul original sigilat și pentru recomandarea dozei care trebuie utilizată pentru fiecare cultură. Orice riscuri legate de depozitarea, manipularea și utilizarea produsului sunt responsabilitatea utilizatorului. În caz de urgență, apelați serviciul unic de urgență.

Data fabricației: indicată pe ambalaj

Numar loc: indicat pe ambalaj

Importator: SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL,

DN 2B km 9+900m, 120000 Buzau

DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL

EMB 02602 A

