

АЛТЕРНАРИА

СКЛЕРОТИНИЯ

ФУЗАРИУМ

РЪЖДА

ЕФЕКТ НА
РАСТЕЖЕН
РЕГУЛАТОР

TebuGUARD Plus

СИЛНО КОНЦЕНТРИРАН ФУНГИЦИД С ШИРОК СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

TebuGUARD Plus е системен фунгицид с активно вещество Тебуконазол. Отлично превантивно и лечебно действие срещу

икономически значими болести при житни култури и рапица. Има удължен срок на действие.

ADVANTAGES

Активно вещество:

- ▶ широкоспектърен системен фунгицид за защита на зърнено-житни култури и рапица
- ▶ специалист в борбата с фузариум по класа
- ▶ с фунгициден ефект и действие като растежен регулатор при рапица
- ▶ дълготрайна ефикасност след прилагане
- ▶ гъвкав за употреба

Иновативна формулация СК

- ▶ Добър партньор в комбинация с други пестициди-висока концентрация, повече декари с по-малко литри
- ▶ по-малък обем за пълнене в пръскачката, по-бързо зареждане до 70% по-малко отпадъци от опаковки

Активно вещество: тебуконазол 430 g/l

Формулация: Суспензионен концентрат (СК)

Опаковка: 5 l

ПРЕДИМСТВА

- ▶ Тебуконазолът се усвоява чрез листата и стъблата на растенията, благодарение на системното действие активните вещества се пренасят чрез проводящите съдове из цялото растение осигурявайки му защита отвътре. Той подтиска биосинтеза на ергостерол в две фази на метаболизма. Препоръчително е да не се намалява дозата и винаги да се използва в комбинация с друг продукт, за да се избегне появата на резистентност.
- ▶ При житни подсигурява защита срещу фузариум по класа и ръжда, със допълнителен ефект срещу брашнеста мана, хелминтоспориоза, кафяви петна и листен пригор.
- ▶ При рапица, подсигурява, защита срещу Склеротиния, има допълнителен ефект срещу Цилиндроспориоза и Алтернария. При употреба през есента и пролетта има ефект на растежен регулатор.




Рапица - Алтернария



Рапица - Склеротиния




Пшеница - Фузариум по класа



Пшеница - Жълта ръжда

Tebuconazol 250 EW сравнен с TebuGUARD Plus



Култура	Ефикасност	Доза (мл/дка)	Максимален брой приложения на година	Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата.
Овес	Коронеста ръжда (<i>Puccinia coronata</i>)	60 мл/дка	1	35
Пшеница	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis f. sp. tritici</i>)	60 мл/дка	1	35
	Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), Септориоза			
	Septoria spp., Фузариум по класа (<i>Fusarium graminearum</i>)			
Ечемик (зимен и пролетен)	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis f. sp. hordei</i>)	60 мл/дка	1	35
	Кафява, ръжда (<i>Puccinia hordei</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>)			
	Ленточна болест (<i>Helminthosporium gramineum</i>), Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			
Ръж	Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	60 мл/дка	1	35
	Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Септориоза (<i>Septoria spp.</i>)			
Тритикале	Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Септориоза (<i>Septoria spp.</i>)	60 мл/дка	1	35
Рапица*	Склеротиниоза (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Черни петна по листата (<i>Alternaria spp.</i>), Цилиндроспориоза (<i>Cylindrosporium spp.</i>), <i>Pseudocercospora spp.</i> , ограничаване растежа на стъблото	60 мл/дка	2	63