



BorphoSTART

ПЕРФЕКТНАТА КОМБИНАЦИЯ НА БОР И ФОСФОР В ЕДНО

BorphoSTART е балансирана формулация на Бор и Фосфор. Тези два минерални елемента са основни за клетъчното делене. По този начин BorphoSTART гарантира добър вегетативен растеж и плодovitост на полена.

ПОЛЗИ

ФОРМУЛАЦИЯ

- ▶ Висококачествена формулация с технологични добавки и коформуланти от 100% растителен произход (ПОЛИОЛИ) за оптимално усвояване.

ПРЕДИМСТВА

- ▶ Балансирана формулация
- ▶ Оптимизира цъфтежа
- ▶ Оптимизира растежа
- ▶ По-добра и по-силна коренова система
- ▶ Оптимизира компонентите на добива

Бор


- ▶ Играе жизненоважна роля в опрашването и оплождането
- ▶ Позволява по-добро развитие на кореновата система, подобрява минералното хранене и усвояването на водата.
- ▶ Подобрява устойчивостта на клетъчните стени (устойчивост на студ) и регулира водния поток (устойчивост на суша)

Фосфор

- ▶ Позволява по-добро вкореняване на растението
- ▶ Подобрява цъфтежа и процеса на оплождане
- ▶ Играе важна роля в узряването на семената

Състав: 120 g/l B, 100 g/l P₂O₅

ПЕРФЕКТНА КОМБИНАЦИЯ



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОЗИ

Култура	Дозировка	Фаза на приложение
Слънчоглед	200 мл/дка или 2 л/ха	От 5 до 8-ми лист (BBCH 15–18)
Рапица	300 мл/дка или 3 л/ха	Есен: във фаза розетка, (BBCH 15) Пролет: начало на нарастване на стъблото до оформени единични цветни пъпки–затворени (BBCH 30–55)
Люцерна	150 мл/дка или 1,5 л/ха	При подрастване и след всяко косене
Грах, Боб, Фий, Леща	150 мл/дка или 1,5 л/ха	От 10–12 ст до поява на първи цветни пъпки (BBCH 15–51)
Лозя	4 × 100 мл/дка или 4 × 1 л/ха	1-во приложение: фаза развитие на съцветията, цветчетата са разделени (BBCH 57) 2-ро приложение: фаза край на цъфтеж, (BBCH 69) 3-то приложение: фаза завърз, начало на наедряване на плодовете (BBCH 71) 4-то приложение: фаза начало на узряване (BBCH 81)
Овощни дръвчета	4 × 100 мл/дка или 4 × 1 л/ха	Първо приложение: фаза начало на цъфтеж–затворен цвят (BBCH 51) следващите 3 приложения през 14 дни
Зеленчуци	4 × 200–300 мл/дка или 4 × 2–3 л/ха	Добре развита листна маса
Захарно цвекло	2 × 100–200 мл/дка или 2 × 1–2 л/ха	1–во приложение: при напълно развита листна маса (BBCH 39) 2–ро приложение: след 21 дни (BBCH 39 + 3 седмици)

Почвено приложение преди или след сеитба: 400–800 мл/дка