

CereaSTART

EO TOP – многокомпонентен течен топ

ÎNGRĂȘĂMÂNT CE – îngrășământ lichid cu multicomponente

C.2.7.



Състав Elemente	Концентрация Concentratie	Обем Volum	Нетно тегло Greutate netă	
Фосфор (P_2O_5) водоразтворим Fosfor (P_2O_5) solubil în apă	29%	440 g/l	14,9 Kg	10 L
Калий (K_2O) водоразтворим Potasiu (K_2O) solubil în apă	5%	76 g/l		
Магнезий (MgO) водоразтворим Magneziu (MgO) solubil în apă	6,7%	100 g/l		



soufflet
aGRO

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждания на очите. • **P102** Да се съхранява извън обсега на деца. • **P280** Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице. • **P303+P361+P353** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): свалете замърсеното облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ. • **P305+P351+P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно продължете с изплакване. • **P310** Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. • **P501** Изхвърляйте съдържанието/опаковката съгласно действащите закони разпоредби. Съдържанието/опаковката да се предадат на одобрени за целта събирателни пунктове.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА

Основни култури	Доза (л/дка)	Брой приложения	Период на приложение
Ечемик	0,3–0,5	1–3 ×	Ранна пролет, в началото на възбуждане на вегетацията и 10–15 дни по-късно при необходимост
Пшеница	0,3–0,5	1–3 ×	Ранна пролет, в началото на възбуждане на вегетацията и 10–15 дни по-късно при необходимост
Царевица	0,3–0,5	1–3 ×	Във фаза 4–5-ти лист и 10–15 дни по-късно при необходимост
Рапица	0,3–0,5	2 ×	Във фаза 4-6-ти лист (през осената) и в началото на възбуждане на вегетацията (през пролетта)
Цвекло	0,3–0,5	1–3 ×	Във фаза 4–6-ти лист и 10–15 дни по-късно при необходимост
Картофи	0,51 1,01	2–3 × 1–2 ×	В началните етапи на развитието на клубните (при производство и семеноразводство)
Трах	0,3–0,5	1 ×	При височина на културата 10–15 см

Да се използва само при необходимост. Да не се превъзвеща препоръчаната доза.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА За постигане на максимален ефект е необходимо използването на достатъчно количество вода на декар, което да осигури равномерно разпределение на продукта по цялата листна повърхност без изтичане. Препоръчителното количество вода е 20 л/дка. Добавете постепенно продукта в наполовина пълен резервоар с вода при непрекъснато разбъркване. Използвайте веднага! За предпочитане е третирано да се извършва при температури между 6 и 25 градуса.

СЪВМЕСТИМОСТ При необходимост от смесване на CereastART с други често използвани препарати (фунгициди и инсектициди), продуктът се добавя последен, след извършване на предварителен тест за смесимост. В случай на смесване с други листни торове, препоръчително е да се консултирате с техния производител.

СЪХРАНЕНИЕ Съхранявайте продукта само в оригиналната опаковка, херметически затворени при температури от 5–30 градуса. Пазете от замръзване, на място, защитено от директна слънчева светлина и влага.

ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ • **Общи съвети:** При поява на здравословни проблеми или в случай на съмнение, обърнете се към лекар и му предоставяте информацията от етикета или проспекта. **При вдъшване:** прекратете работата, изведете пострадалия на чист въздух и поддигнете доброто му физическо и психическо състояние. **При попадане върху кожата:** свалете замърсеното облекло. Незабавно измиете засегнатите части от тялото с топла вода и сапун. Изплакнете обилно с вода. **При попадане в очите:** Незабавно изплакнете с обилно количество топла вода при отворени очни клепачи в продължение на най-малко 15 минути, като обърнете особено внимание на зоната под клепачите. Ако симптомите продължават (зачервяване, усещане за парене) незабавно се консултирате с офталмолог за назначаване на лечение. **В случай на поглъщане:** изплакнете устата с вода (само ако пострадалият е в съзнание и няма спазми, не предизвиквайте повръщане. Незабавно се консултирате с лекар и му покажете, този етикет, проспекта или листа за безопасност. **Преди лечение:** преди прием на лекарствени продукти информирайте лекуващия лекар за продукта, с който е работил пострадалия и мерките за първа помощ. При необходимост, вземете допълнителни мерки за осигуряване на първа помощ (и евентуално последващо лечение). При спешни случаи се обърнете към „Клиника по токсикология“ към УМБАЛ „СМ. Н.И. Пирогов“ на тел: + 359 2 9154 233 / + 359 2 9154 409.

Дата на производство: виж опаковката • **Партиден номер:** виж опаковката

Производител: AGRONUTRITION,
Parc Activesre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France

Вносител: СУФЛЕ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД,
Бул. Генерал Едуард, И. Тотлебен 53–55, 1606 София,
e-mail: agro_bulgaria@soufflet.com

AVERTISMENT

H314 Cauzează arsuri severe ale pielii și vătămarea ochilor. • **P102** Nu lăsați la îndemâna copiilor. • **P280** Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție/ochelari de protecție/mască de protecție. • **P303+P361+P353** DACĂ AJUNGE PE PIELE (sau păr): Îndepărtați/eliminați toate hainele contaminate. • **P305+P351+P338** DACĂ AJUNGE ÎN OCHI: Clătiți cu apă pentru câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă există. Continuați clătirea. • **P310** Sunați imediat la un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un medic. Aruncați conținutul/ambalajul la un centru de colectare aprobat. • **P501** Aruncați conținutul/recipientul conform regulamentărilor în vigoare. Încolțiți conținutul/recipientul la un centru de colectare aprobat.

DOZARE RECOMANDĂTĂ

Culturi principale	Doze	Aplicare	Data aplicare
Orz	3–5 l	1–3 ×	De la mijlocul infirmității până la începutul creșterii și 10–15 zile mai târziu dacă este necesar
Grâu	3–5 l	1–3 ×	De la mijlocul infirmității până la începutul creșterii și 10–15 zile mai târziu dacă este necesar
Porumb	3–5 l	1–3 ×	Din stadiul 4–6 frunze și 10–15 zile mai târziu dacă este necesar
Rapita	3–5 l	2 ×	Din stadiul 4–6 frunze (toamna) și la începutul înfloririi (primăvara)
Sfeclă	3–5 l	1–3 ×	Din stadiul 4–6 frunze și 10–15 zile mai târziu dacă este necesar
Cartofi	5 l 10 l	2–3 × 1–2 ×	Din stadiul tuberizării (la producție) și înainte de tuberizare (multiplicare)
Mazăre	3–5 l	1 ×	La tălia plantei de 10–15 cm

A se folosi doar în caz de necesitate. A nu se depăși doza recomandată.

SFATURI PRACTICE DE UTILIZARE Pentru o eficacitate maximă, folosiți un volum de apă/hu suficient pentru obținerea repartiției omogene pe ansamblul frunzișului fără scurgerea produsului. Doza recomandată de apă este de 200 l/ha. Adugați progresiv produsul, atunci când cura este umplută pe jumătate cu apă și sistemul de agitare pornit. Aplicați imediat. Sunt de preferat temperaturile la temperaturi între 6 și 25 °C.

SFATURI REFERITORE LA AMESTECURI În cazul amestecului produsului CereastART cu alte produse (fungicide și insecticide folosite în mod obișnuit), adăugați acesta ca ultimul produs și efectuați întotdeauna un test în prealabil. În cazul amestecului cu alte îngrășăminte foliare, este recomandată să consultați producătorii acestora.

SFATURI DE DEPOZITARE Păstrați produsul în recipientul original închis ermetic, la temperaturi de 5–30 °C. Păstrați ferit de ger, de umiditate și de lumina directă a soarelui.

PRIMUL AJUTOR • Sfaturi generale: în cazul problemelor de sănătate sau dacă aveți îndoieli, informați medicul și furnizați-i informațiile de pe etichetă sau de pe prospect. **În caz de inhalare:** opriti expunerea, asigurați starea fizică și mentală. **În caz de contact cu pielea:** spălați hainele contaminate. Spălați pielea afectată imediat cu apă caldă și săpun, clătiți abundent cu apă. **În caz de contact cu ochii:** spălați imediat cu multă apă cu pleoapele deschise și clătiți cel puțin 15 minute – în mod principal nozzle-ul de sub pleoape – spălați de preferință cu multă apă caldă. Dacă simptomele persistă (roșeață, senzație de arsură), consultați imediat medicul (pentru un tratament medical). **În caz de ingestie accidentală:** clătiți gura cu apă (doar dacă victima este conștientă și nu prezintă crampe), nu provocați vomă. Consultați imediat medicul și arătați-i eticheta, prospectul, sau instrucțiunile speciale/informațiile de siguranță. **Înainte de un tratament medical:** înainte de un tratament medical, fișa medicului dvs. referitor la produsul cu care a lucrat victima și referitor la primul ajutor. Dacă este necesar, aplicați măsuri suplimentare pentru a asigura primul ajutor (și eventual un tratament ulterior), consultați Centrul de Informare Toxicologică: **Institutul de Sanatate Publică, București, telefon: +40 21 318 36 20, interior 235.**

Data fabricației: indicată pe ambalaj • **Număr lot:** indicat pe ambalaj

Producător: AGRONUTRITION
Parc Activesre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France

Importator: SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL
DN 2B km 9+900m, 120000 Buzau,
Tel. +40 238 402 868



Opasnost
Pericol

