

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

ТЕБУГАРД ПЛЮС

TebuGUARD Plus

Функция на продукта: фунгицид.

Съдържание на активно вещество: тебуконазол 430 г/л (39,81 % w/w).

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК).

Категория на употреба: втора професионална.

Разрешен за употреба в Р. България с Разрешение №: 01714-ПР3/1-08.05.2019 г.

Предупреждения за опасност:

H302 Вреден при поглъщане.

H361d Предполага се, че урежда плода.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

P202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: потърсете медицински съвет/помощ.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

Допълнително етикетирание:

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

SP 1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства използваната техника в близост до повърхности на води/Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.).

SPe 3 - Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра по протежение на водни повърхности, с цел опазване на водните организми. Период на повторно влизане в парцела: 6 часа.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО

ROTAM AGROCHEMICAL Europe Ltd, Hamilton House, Mabledon Place - Лондон, WC1H 9BB Англия

ДИСТРИБУТОР

Суфлет Агро България
ПК 1303 София
ул. Позитано 37 - Бизнес сграда

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години при препоръчаните условия на съхранение.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: виж опаковката.

Партида №: виж опаковката.
НЕТО КОЛИЧЕСТВО: 5L



ВНИМАНИЕ



soufflet
AGRO

5L

TebuGUARD Plus

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

ТebuГuаrD Plus действа чрез въвеждане на патогена, чрез възприемане биосинтеза на еростерол чрез блокиране на процеса на деметилиране. Както и другите триазоли, TebuГuаrD Plus действа чрез блокиране на синтеза на бисинтезата на стероли. FRAC (Комитетът за резистентност към действието на фунгициди) е класифицирал TebuГuаrD Plus и други триазоли в група DM1 (инхибитори на деметилиране), SBI клас I. За да се намали рискът от поява или развитие на резистентност, е препоръчително да се спазват следните препоръки:

- Прилагайте **TEBUGUARD PLUS** в одобрена доза.
- При силно напедане от патогени, за достигане на висока ефективност на фунгицида, трябва да се спазват препоръките на етикета: важно е да се избегнат ленебни приложения и в случай на използване в резервоарна смес с друг фунгицид, който не принадлежи към семейството на триазоли, трябва да се прилага с разрешената доза.
- Изпълнението на програми за третиране с намалена доза е забранено, тъй като това води до повишаване на натиска върху селекцията на патогените, явление, което може да доведе до формиране на резистентни щамове при патогените.
- Да се редуват продукти с различен начин на действие или продукти, които съчетават активни вещества с различен начин на действие.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Култури	Патогени	Доза (мл продукт / дца)	Максимален брой приложения на година	Карантинен срок - минимален интервал в дни преди прибиране на реколтата
Овес	Коронета ръжда (<i>Puccinia coronata</i>)	60 мл/дка	1	35
Пшеница	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i> f. sp. tritici), Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), Септориоза (<i>Septoria spp.</i> , Фузарум по класа (<i>Fusarium graminearum</i>))	60 мл/дка	1	35
	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i> f. sp. hordei), Кафява ръжда (<i>Puccinia hordei</i>), Жълта ръжда (<i>Puccinia striiformis</i>), Лептоса болест (<i>Helminthosporium gramineum</i>), Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	60 мл/дка	1	35
Ръж	Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Листен пригор (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	60 мл/дка	1	35
Тритикале	Кафява ръжда (<i>Puccinia recondita</i>), Септориоза (<i>Septoria spp.</i>)	60 мл/дка	1	35
Рапица*	Склеротиниоза (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Черни петна по листата (<i>Alternaria spp.</i>), Цилиндроспориоза (<i>Cylindrosporium spp.</i>), Pseudoocerospora spp., ограничаване растежа на стъблото	60 мл/дка	2	63

* Да се спазва закона за пчеларството.

Коледно вода: 20-60 л/дка

Техника за прилагане: механизирана наземна техника.

ПРИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ:

TEBUGUARD PLUS се използва до фенофа цфтек; може да се прилага самостоятелно, но може също така да се интегрира във всяка програма за защита. **TEBUGUARD PLUS** се прилага от началото на проява на симптомите на болестта. Следвайте препоръките на бюлетините за земеделските служби за ранно предизвестяване.

ПРИ РАПИЦА:

TEBUGUARD PLUS може да се използва като регулатор на растежа или фунгицид до BVCH 57-59 (видимо оформени единични цветни пъпки, но още затворени (вторично цветообразуване) – видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени („жълт бутон“).

РЕГУЛАТОР НА РАСТЕЖА ПРИ РАПИЦА:

TEBUGUARD PLUS може да се използва в два стадия от развитието на културата: През есента, във фенофази от затворени 4ти до разтворен 6ти лист (BVCH 14 - 16) в случай на ранно напедане на културата, за да се ограничи рискът от удължаване. През пролетта във фенофази от видимо нарастване на първо междувеличното до видимо оформени единични цветни пъпки, но все още затворени (вторично цветообразуване) (BVCH 31 - 57), за да се ограничи рискът от ранно зреене.

ФУНГИЦИД ПРИ РАПИЦА:

За контрол на черни петна по листата (*Alternaria spp.*), Цилиндроспориоза (*Cylindrosporium spp.*),

Склеротиниоза (*Sclerotinia sclerotiorum*) и Pseudoocerospora spp: да се прилага при появата на симптомите.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

В случай на подхран недостатък на вода или високи температури амплитуди, да се избягва третирането на тощи засети зърнено - житни култури, както и при засушаване на почвата. Да не се третира при температури над 30 °C.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНАЯ РАЗТВОР

Разбъркайте продукта в опаковката преди употреба. **TEBUGUARD PLUS** се използва за разбъркан след разреждане с вода. Напълнете резервоара на пръскачката с чиста вода до 2/3, включете смесителя, разбъркайте опаковката и излейте количеството **TEBUGUARD PLUS**. Допълнете резервоара с необходимото количество вода.

ТЕХНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ

Използвайте оборудване, адаптирано към културата и патогена. Внимавайте за равномерно разпределение на разтвора върху цялата растителност. Оставете разбърканото в резервоара да работи по време на придвижването в парцела и до края на пръскането.

СМЕСИ

Смесите трябва да се изпълняват в съответствие със съществуващото законодателство и препоръките на официалните ръководства за добра практика.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Да се използват лични предпазни средства - предпазни ръкавици по време на смесване/зареждане и предпазно облекло при прилагане, за да се сведе риска за оператора до приемливо ниво.

Предп прилагане: да се съхранява в подходящо за продукти за растителна защита помещение, под ключ. Прочетете етикета и предпазните мерки преди употреба, за да защитите ефективно културите.

Редовно проверявайте и поддържайте доброто състояние и калибрирането на оборудването за прилагане, следете пълненето на резервоара за пръскане и регулирайте обема на сместа. Изпакнете опаковката трикратно ръчно и излейте водата от използването в резервоара на пръскачката.

По време на употреба: При контакт с кожата или очите, засенятият участък да се изплакне незабавно обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Да не се вдихват парите или аерозолите. Да не се третират потоци и канавки с вода. Пръскайте върху културата при тихо време, без силен вятър, за да се избегне отнасяне на струята към канавки, реки, пътища, стопански сгради или околностите. Изпърскайте остатъка от сместа, след като го разредите с вода.

След прилагане: Почистете предпазните средства. Измити ръцете си. Вземете душ. Да се носи подходящо облекло от работника, който влиза в участък след третирането.

Съхранение: съхранявайте в плътно затворени опаковки, на сухо, хладно и добре провертено място.

ПЪРВА ПОМОЩ

При вдихване: Изведете пострадалия на чист въздух.

При контакт с кожата: Съблечете незабавно замърсените дрехи. Незабавно измити засенятите области с вода и сапун.

При контакт с очите: изплакнете обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако дразменето продължава, консултирайте се със специалист.

При поглъщане: Изплатете устата с вода. Да не се предизвиква повръщане. Консултирайте се с лекар незабавно и покажете контейнера или етикета.

НИКОГА НЕ ДАВАЙТЕ НИЦЮ ПРЕЗ УСТАТА НА ЧОВЕК В БЕЗСЪЗНАНИЕ.

Център за първа помощ в Република България:

УМБАЛМС "Н.И.Пирогов"
Тел. +359 2 9154 409 (денонощен)
poison_centre@mail.orbitel.bg
<http://www.pirogov.bg>

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

ИЗВЪРЯНЕ НА ПРОДУКТА И ОПАКОВКАТА

За обезвредяване на негодни за употреба продукти се съвместява с оторирирана компания за събиране и обезвредяване на опасни отпадъци. Повторната употреба на опаковка е забранена. Изпакнете опаковката най-малко 3 пъти преди изхвърляне. При използване на продукта изпразнене опаковката добре. Изхвърляйте празните контейнери в пунктовете за организирано събиране на отпадъци.