

OilSTART^{NG}

EO TOP – Смес от микроелементи Бор (В, етаноламин) и Молибден (Мо, амоний)

FERTILIZANT EC – Amestec de microelemente Bor (В, етаноланинă) și Molibden (Мо, амонiu)

E.2.4.



Състав Elemente	Концентрация (% маса) Concentratie	Обем Volum	Нетно тегло Greutate netă	
Водоразтворим бор (В) Bor solubil în apă (В)	1,79%	25 g/l	13,55 Kg	10 L
Водоразтворим молибден (Мо) Molibden solubil în apă (Мо)	0,214%	3 g/l		



soufflet
AGRO

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

H315 Преди употреба дразнене на кожата. • **P102** Да се съхранява извън обсега на деца. **P201** Преди употреба се снабдете със специални инструкции. • **P264** Измийте ръцете си старателно след употреба. • **P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. • **P302+ P352** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. • **P332+ P313** При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ. • **P501** Съдържанието/опаковката да се изхвърли в съответствие с местните / регионалните / националните / международните разпоредби. Предадете съдържанието/опаковката в одобрено за целта събирателен пункт.

Пълнота: 1.385

ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ: Азот (N): 25 g/L • Сярна (SO₂): 990 g/L

ПРЕПОРЪКИ ЗА КУЛТУРИТЕ Листо приложение

Вид култура	Дози	Период на приложение
Рапица	0,5 л /дка – Максимална концентрация: 3 %	1–2 пъти от 2–3-ти листо до началото на цъфтежа
Цвекло	0,5 л /дка – Максимална концентрация: 3 %	2 пъти с начален период от добре развитата листна маса
Слънчоглед	0,5 л /дка – Максимална концентрация: 3 %	2 пъти – във фаза 5 чифта листа и във фаза преди цъфтеж
Други култури*	0,5 л /дка – Максимална концентрация: 3 %	1–2 пъти при добре развитата листна маса

* За защитени култури се препоръчва да направите първоначален тест при концентрация от 2,5% и да наблюдавате реакцията на растението.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

За най-добри резултати използвайте достатъчно вода, за да постигнете равномерно покритие на цялата реколта без изтичане. Избягвайте прилагане при силна слънчева светлина и/или високи температури. При възможност използвайте вечер или рано сутрин, особено ако температурите през деня надвишават 28°C. Вижте частта „Препоръки за културите“ на този етикет за дози и период на приложение при различните култури.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

1. Напълнете резервоара за пръскане с половината от посоченото количество вода и започнете да бъркате.
2. Разклатете добре опаковката преди отваряне и добавете необходимото количество от този продукт, след което добавете останалото количество вода, като не спирате да бъркате. При смесване с други компоненти в резервоара, винаги добавяйте този продукт след препаратата на прах. Не оставяйте сместа без бъркане.
3. След пръскане, почистете и изплакнете старателно уредите.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

Производителите и търговците на този продукт гарантират, че опакованият препарат съдържа посочените активни съставки в допустими граници. Тяхната отговорност се свежда до доставката на продукта в оригиналната му опаковка, а употребата му трябва да съответства на препоръчителната доза. Всички рискове произтичащи от съхранението, манипулацията и употребата на продукта са отговорност на потребителя.

Дата на производство: виж опаковката • **Партиден номер:** виж опаковката

Вносител: СУФЛЕ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД Бул. Генерал Едуард, И. Топлевен 53-55 1606 София, Email: agro_bulgaria@soufflet.com

Производител: AGRONUTRITION Parc Actievestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France



3 349990 016347

ПРЕАУЩИ

H315 Провокач иритация на кожата. • **P102** А ну се лăша на ъндemăна copiiilor. • **P201** Procrați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. • **P264** Spălați-vă mâinile după utilizare. • **P280** Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / protecție pentru ochi / protecție pentru față. • **P302+ P352** DACĂ AJUNGE PE PIELE: Spălați cu apă și săpun din abundență. • **P332+ P313** În caz de iritare a pielii: consultați medicul. • **P501** Eliminați conținutul /recipientul conform regulilor locale / regionale / naționale / internaționale. • Ambalajele / conținutul se vor colecta la un centru autorizat.

Densitate: 1.385

ALTE ELEMENTE: Azot (N): 25 g/l • Sulf (SO₂): 990 g/l

DOZARE RECOMANDATĂ Aplicarea foliară

Culturi principale	Doze	Dată aplicare
Рапица	5 l/ha (concentrație maximă: 3%)	1–2 aplicări din stadiul de 2/3 frunze până la începutul înfloririi
Сфeцлa de zahăr	5 l/ha (concentrație maximă: 3%)	2 aplicări: în perioada cuprinsa între apariție – aparat foliar bine dezvoltat
Floarea soarelui	5 l/ha (concentrație maximă: 3%)	2 aplicări în perioada cuprinsa între stadiul 5 perechi de frunze – începutul înfloririi
Alte culturi *	5 l/ha (concentrație maximă: 3%)	1–2 aplicări pe aparat foliar foarte bine dezvoltat

* Pentru culturi protejate, va trebui efectuat un test preliminar la concentrația de 2,5% și observata reactia plantei.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați suficient de multă apă pentru a obține o acoperire buna a culturii. Evitați pulverizarea la temperaturi foarte ridicate și / sau în lumina puternică a soarelui. Dacă este posibil, aplicați pe timp de seară sau dimineața devreme, în special dacă temperaturile din timpul zilei depășesc 28°C. Urmați Recomandările la aplicare precum și dozele și perioada de aplicare pentru fiecare cultură in parte.

AMESTECARE

1. Umpleți резервоарул pulverizatorului cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeți să agitați.
2. Agitați recipientul foarte bine înainte de deschidere și adăugați cantitatea necesară de OiI START NG, apoi adăugați restul de apă agitând continuu. Când combinați OiI START NG cu alte componente în резервоарул pulverizatorului, adăugați întodeauna OiI START NG ca ultim produs. Mențineți agitatorul în funcțiune.
3. După pulverizare, curățați și spălați cu apă din abundență echipamentul.

IN ATENȚIA UTILIZATORULUI

Producătorul și vânzătorul produsului garantează calitatea produsului și conținutul de substanțe active specificate. Producătorul și vânzătorul își declina orice responsabilitate cu privire la utilizarea produsului. Nu va fi acceptata nicio responsabilitate pentru eventualele daune sau prejudicii care pot să apară pe durata depozitării, manevrării, aplicării sau utilizării incorecte a produsului.

Data fabricației: indicată pe ambalaj

Număr lot: indicat pe ambalaj

Producător: AGRONUTRITION Parc Actievestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France
Importator: SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL DN 25 km E+900M, 120000 Buzau, Tel. +40 238 402 868



ВНИМАНИЕ / AVERTIZARE