

CereaSTART

ЛИСТЕН ТОР ЗА БЛЕСТЯЩ СТАРТ В НАЧАЛОТО НА РАСТЕЖА

Листен тор, който стимулира растежа на зърнените култури, както и развитието на кореновата система по време на ранните етапи на растеж (до братене). Той допринася за развитието на репродуктивните органи на растенията, както и на листната площ. CereaSTART съчетава предимствата на тор с високо съдържание на фосфор с тези на течен тор. Листното прилагане подкрепя по-доброто усвояване на хранителните вещества до кореновата

система, независимо от почвените условия.

Той помага за отстраняването на всички стандартни проблеми обвързани със сушата, ниски температури и ниски нива на pH на почвите. Прилагането на CereaSTART осигурява гладко бъдещо развитие на вашите култури с по-високи потенциални добиви и нива на качество.

ПРЕДИМСТВА НА ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ФОСФОР

- ▶ Засилва кореновата система на растението така, че е в състояние да абсорбира максимално количество хранителни вещества от почвата от само себе си
- ▶ Компенсира дефицита на усвоим фосфор в почвата
- ▶ Подкрепя развитието на репродуктивните органи
- ▶ Запазва хранителните вещества усвоими в листата

ПРЕДИМСТВА НА ЛИСТНО ПРИЛАГАНЕ

Усвояването на фосфора от листата подкрепя по-доброто проникване на хранителните вещества до корена, независимо от почвените условия.

Независимост от pH нивата на почвата

Растенията се възползват от предимствата на фосфора (т.е. по-високи нива на абсорбция на хранителни вещества), независимо от нивото на pH на почвата.

Независимост от температурните условия на почвата


Растението поглъща по-използваем фосфор, без значение дали идеалната температура на почвата от 21 °C е достигната. (Спад на температурата от 21 °C на 13 °C намалява наличието на фосфор със 70% и значително понижава развитието на корените).

Независимост от сухотата на почвата

Фосфорът се поглъща дори при сухи почви.

СЪСТАВ: 440 g/l P_2O_5 , 76 g/l K_2O , 100 g/l MgO
ОПАКОВКА: 10, 600 л

Оптимално и бързо проникване на елементите




ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА И ПЕРИОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Основни култури	Доза (мл/дка)	Брой приложения	Период на приложение
Пшеница и ечемик	300	От 1 до 3	Средата на братене - първи възел - в началото на пролетта, малко след рестартиране на вегетационния процес
Царевица	300	От 1 до 3	Във фаза 4–6-ти лист
Рапица	300	2	1. Есен – във фаза 4–6-ти лист 2. Пролет - В началото на стрелкуване
Цвекло	300–500	От 1 до 3	Във фаза 4–6-ти лист
Картофи	500	От 2 до 3	Търговска култура - на етап малка грудка
	100	От 1 до 2	Картофено семе - начална фаза на развитие на грудка
Грах	300–500	1	При височина 10–15 см
Пролетен ечемик	300	От 1 до 3	Средата на братене - първи възел




CereaSTART има отлична смесимост с фунгициди, инсектициди и хербициди.


ЦАРЕВИЦА



ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК



КАРТОФ



ПРОЛЕТЕН ЕЧЕМИК

