

BorphoSTART

FERTEQ



EO TOP – БОР ЕТАНОЛАМИН
ÎNGRĂȘĂMÂNT CE – BOR ETANOLAMINĂ
E.1.1.1D

Състав

Elemente

Концентрация %
Concentrație %

Нетен обем
Volum

Бор (B) водоразтворим

Bor (B) solubil în apă

8,4 %

120 g/l

Фосфорен пентаоксид (P_2O_5)
водоразтворим

Anhidridă fosforică (P_2O_5) solubil în apă

7 %

100 g/l



soufflet
agro



14,1 kg

10L

BG

BorphaSTART е балансирана формулация на бор-фосфор. Тези два елемента са от съществено значение за кълъното делене. Поради това BorphaSTART гарантира увеличаване на растежа и плодovitостта на полена на културите.

ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Култура	Дозировка	Период на приложение
Слънчоглед	200 мл/дха или 2 л/ха	От 5 до 8-ми лист (BBCH 15–18)
Рапица	2 × 100 мл/дха или 1 л/ха	Есен: във фаза розетка, (BBCH 15) Пролет: начало на нарастване на стъблото до оформени единични цветни пъпки–затворени (BBCH 30–55)
Люцерна	2 × 100 мл/дха или 1 л/ха	При подравняване и след всяко косене
Грах, Боб, Фий, Леща	150 мл/дха или 1,5 л/ха	От 10–12 стъ до поява на първи цветни пъпки (BBCH 15–51)
Лозя	4 × 100 мл/дха или 4 × 1 л/ха	1-во приложение: фаза развитие на съцветията, цветчатата са разделени (BBCH 57) 2-ро приложение: фаза край на цфтьез, (BBCH 69) 3-то приложение: фаза завърз, начало на наедраване на плодoвете (BBCH 71) 4-то приложение: фаза начало на узряване (BBCH 81)
Овощи дръвчета	4 × 100 мл/дха или 4 × 1 л/ха	Първо приложение: фаза начало на цфтьез–затворен цфть (BBCH 51) следващите 3 приложения през 14 дни
Зеленчуци	4 × 100 мл/дха или 4 × л/ха	Добре развита листна маса
Захарно цвекло	2 × 100–200 мл/дха или 2 × 1–2 л/ха	1-во приложение: при напълно развита листна маса (BBCH 39) 2-ро приложение: след 21 дни (BBCH 39 + 3 седмици)

Да се използва само при призната нужда. Да не се превишават подходящите норми на дозата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: Приготвяне на сместа **1.** Да се разклати добре преди употреба. **2.** Пълни се ¼ от пръскачката с вода **3.** Гуска се бъркалката на пръскачката и след това се добавя BorphaSTART **4.** Бъркането продължава до получаване на хомогенна смес. Да се прилага по време на активния период на растеж, избягвайки най-горещите часове на деня. Спазвайте обичайните предпазни мерки при употребата на химикали.

СМЕСИМОСТ: BorphaSTART е съвместим с повечето продукти за растителна защита. При съмнение, препоръчително е да се правят тестове за съвместимост с използваните продукти.

ПРАЗНА ОПАКОВКА: Повторната употреба на опаковката е абсолютно забранена. Когато използвате продукта, изпакетните контейнера и изпитите водата обратно в пръскачката. Предавайте празните опаковки в одобрен за цента събирателен пункт.

ОБЩИ СЪВЕТИ: Да се съхранява на място, недостъпно за деца и далеч от хранителни продукти. Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, на сухо и хладно място. Съхранявайте при постоянна температура и в условия, които не позволяват замръзване. Нашата отговорност е ограничена до предоставянето на продукта в оригиналната си запечатана опаковка и препоръчване на дозата, която ще се използва за всяка култура. Всеки риск, свързан със съхранението, използването на продукта, е отговорност единствено на потребителя. В случай на спешна ситуация, извикайте спешна помощ или се свържете с ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

ОГРАНИЧЕНО САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Дата на производство: виж опаковката

Партиден номер: виж опаковката

Уносител: СУФЛЕ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Позитано № 37, et.4, София, 1303

email: agro_bulgaria@soufflet.com

Производител: SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France

RO

BorphaSTART este o formulare echilibrată de fosfor cu bor. Aceste două elemente sunt esențiale pentru multiplicarea celulelor. Prin urmare, BorphaSTART susține dezvoltarea plantelor și fertilitatea polenului.

APLICARE FOLIARĂ

Culturi principale	Doze	Perioada de aplicare
Floarea-soarelui	2 l/ha	Stadiul 5-8 frunze, BBCH 15/18.
Rapiță	2 l/ha	Toamna: Stadiu de rozetă, BBCH 15. În primăvară: la reluarea vegetației (C1 / C2), BBCH 30 – înainte de înflorire stadiu de muguri imbinți (D1), BBCH 55.
Lucernă	1,5 l/ha	La reluarea vegetației după fiecare coasă.
Mazăre, fasole, mazărice, linte	1,5 l/ha	Stadiul 5-8 frunze BBCH 15 până la apariția mugurilor flori BBCH 51.
Viță de vie	4 × 1 l/ha	La stadiul de înflorirecete, BBCH 57 – stadiul muguri flori, BBCH 69 – Stadiul de fructe, BBCH 71 și la Coacșe, BBCH 81.
Pomi fructiferi	4 × 1 l/ha	Prima aplicare înainte de înflorire, BBCH51, urmată de celelalte aplicări la intervale de 2 săptămâni.
Legumicultură	4 × 1 l/ha	Pe suprafața foliară bine dezvoltată.
Sfecă de zahăr	2 × 1–2 l/ha	1 aplicare la închiderea stadiului BBCH 39. a 2-a aplicare T1+ 3 săptămâni, BBCH 39 + 3 săptămâni.

A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE: Pregătirea amestecului **1.** Agitați bine înainte de utilizare. **2.** Umpleți rezervorul pulverizatorului până la ¾ din volumul apei necesare pentru aplicare. **3.** Porniți agitatorul și apoi turnați BorphaSTART. **4.** Mențineți agitatorul în funcțiune până la omogenizarea amestecului de pulverizare. Aplicați în timpul perioadei de creștere activă, evitând aplicarea atunci când temperaturile sunt ridicate. Respectați măsurile de precauție obișnuite pentru utilizarea chimicelor.

COMPATIBILITĂȚI: BorphaSTART este compatibil cu cele mai multe produse de protecție a plantelor. Efectuați teste de compatibilitate fizico-chimică și biologică înainte de orice amestec nou.

AMBALAJUL GOL: Reutilizarea este interzisă. Când finalizați produsul, clătiți-l și asigurați-vă că apa de clătire este turnată în rezervorul de pulverizare. Ambalajele goale trebuie să fie aruncate printr-un sistem specific de colectare.

SFATURI GENERALE: Nu lăsați la îndemâna copiilor și păstrați departe de alimente. Păstrați produsul în recipientul original, într-un loc răcoros și uscat. Protejați împotriva înghețului. Păstrați la o temperatură constantă. Responsabilitatea noastră se limitează la furnizarea produsului în ambalajul original sigilat și pentru recomandarea dozei care trebuie utilizată pentru fiecare cultură. Orice riscuri legate de depozitare, manipularea și utilizarea produsului sunt responsabilitatea utilizatorului. În caz de urgență, apelați serviciul unic de urgență.

DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL

Data fabricației: indicată pe ambalaj

Nr. lot: indicat pe ambalaj

Importator: SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL,

DN 2B km 9+900m, 120000 Buzău

Producător: SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France

EMB 02602 A



3

613690

009702